

Opløsning af Ikke-permanent filler med Hyaluronidase

Patientinformation

Hvad er en Hyaluronidase?

Hyaluronidase er et receptpligtigt lægemiddel, som kan anvendes til at opløse hyaluronsyrebaseret ikke-permanent filler. Behandlingen kan anvendes hvis du tidligere har fået behandling med ikke-permanent filler, som ikke har haft den ønskede effekt (fx overkorrektion), ved ønske om at vende tilbage til dit oprindelige udseende fra før du fik behandling, eller forud for en eventuel ny behandling. Man kan ikke anvende hyaluronidase til blot at korrigere/reducere en mængde filler i et givet behandlingsområde. Behandlingen skal betragtes som en komplet opløsning af gammelt produkt. Behandlingen er uskadelig for dit væv, men er forbundet med sviden, ubehag, hævelse og rødme umiddelbart efter injektionen. Behandlingen kan *ikke* anvendes til opløsning af permanent filler.

Hvor meget hyaluronidase skal bruges?

Behandlingen indledes med Hyaluroindase 1500 I.U. som opløses i 2,5 ml NaCl og fordeles i vævet. I mange tilfælde vil én behandling være tilstrækkelig, men det må understreges, at der kan være behov for gentagne behandlinger, for at opløse det gamle produkt alt afhængigt af produkttype og -mængde. Særligt ved overbehandlede områder, samt områder, der gennem tiden er behandlet med forskellige filler-produkter, kan det være vanskeligt, at bedømme behandlingsforløbet på forhånd.

Hvor hurtigt virker det?

De fleste vil opleve en synlig effekt allerede efter få døgn. Du kan tidligst få ny behandling med ikke-permanent filler, når der er gået 4 uger efter behandling med hyaluronidase.

Konsultation

Der er ikke lovkrav om betænkningstid forud for behandling med hyaluronidase, hvorfor behandlingen (ved ønske herom) kan indledes samme dag, som du konsulteres.

Behandlingen

Det er hensigtsmæssigt, hvis du møder op til behandlingen uden make-up. For at have et sammenligningsgrundlag, vil der inden behandlingen blive taget kliniske fotos. Området, som skal behandles, vil blive desinficeret og markeret. Med en tynd nål injiceres hyalase i de relevante områder. Behandlingen varer typisk kun få minutter. Vi anbefaler at undgå indtagelse af alkohol, fiskeolie eller acetylsalicylsyre (fx Treo®, Kodimagnyl®) 48 timer inden behandlingen, for at minimere risikoen for blå mærker.

Bivirkninger

Tilsigtede (forventede) bivirkninger:

- Hævelse, sviden og rødme i behandlingsområdet.

Utilsigtede bivirkninger:

- Blå mærker
- Infektion. Mistanken skal opstå ved tiltagende rødme, varme, hævelse og ømhed i behandlingsområdet, som tilkommer og forværres flere dage efter behandlingen. Dette skal ikke forveksles med hævelse lige umiddelbart efter behandlingen, som nævnt ovenfor under tilsigtede bivirkninger.

Ekstremt sjældne bivirkninger

- Allergisk reaktion (anafylaksi)
OBS Lægen har akut handleplan herfor. Mistanken skal opstå ved akut indsættende utilpashed, koldsved, blegghed, hjertebanken, vejrtrækningsbesvær eller nældefeber i minutterne/timerne efter behandlingen. Lægen skal kontaktes omgående ved mistanke om anafylaksi på nedenstående akuttelefon i alle døgnets timer.

Kontrol

14 dage efter behandlingen er du velkommen til at kontakte klinikken med henblik på en kontrol. Det kan blive nødvendigt at tilkøbe gentagne behandlinger, hvis effekten har været utilstrækkelig.

Sikkerhed og fortrolighed

Alle ansatte i klinikken har tavshedspligt. Dine personlige informationer bliver aldrig videregivet til 3. part uden dit samtykke. Ved utilsigtet reaktion kan du døgnet rundt kontakte klinikkens akutnummer tlf. 93909978. Send gerne en sms med et billede.

Med venlig hilsen

Mads Kjersgaard Rasmussen
Behandlingsansvarlig speciallæge, aut ID OCBGC